

# Vurdering av pasienter med rus og psykiske lidelser

Forskningsrådgiver/stipendiat Marianne Stallvik


# Prosjekt matching

- Utvikling og forskningsprosjekt
- Harmonisere praksis
- Bedre utnyttelse av tilgjengelige ressurser
- Samhandling på tvers



## ASAM Kriteria

- Retningslinjer
- Kartlegger og anbefaler omsorgsnivå
- Matcher intensiteten til alvorlighetsgrad



# Design

- Prospektiv dobbel-blindet naturalistisk design
- Vanlig vurderingsintervju vs. ASAM strukturerte intervju-verktøy
- 10 vurderingsinstanser pol og døgn alle tre fylker
- N= 261 (58 pasienter til pol, 203 døgn), n=153 etter 3mnd



## Matching Patients with a substance use disorder to optimal level of care with the ASAM criteria software

- Naturalistisk LOC plassering med disse variablene:

(1) Retensjon

(2) Alvorlighetskår på 7 ASI sammensatte skårer

(3) Hvorvidt de er klare for et lavere omsorgsnivå ved oppfølging



Marianne Stallvik, David R. Gastfriend, Hans M. Nordahl

*Journal of Substance Use* : 1–10.

Posted online on 8 Jul 2014

doi:10.3109/14659891.2014.934305

- **Retensjon** : under-matching vs. matching/over-matching  
(45% vs. 62% vs. 70%,  $p = 0.024$ )
- Match mindre bruk av  
alkohol ( $p < 0.05$ ) og cannabis ( $p < 0.05$ )  
Ingen signifikante reduiseringer under-matchet gruppe
- **ASI** sammensatte skårer favoriserte matching på 6 av 7 dimensjoner  
2 av 7 bedret for under-matched  
3 av 7 bedret for over-matched
- **Lavere nivå** ved oppfølging:  
46% under-matchet  
61% matchet  
17% over-matchet

\* $p < 0.05$ ; † $p < 0.01$ ; ‡ $p < 0.001$

## Convergent validity of the ASAM criteria in co-occurring Disorders

- Undersøkte verktøyets anbefaling :
  - 1) Kun rusbehandling
  - 2) Samtidige rus og psykiske lidelser Kapabel program
  - 3) Samtidige rus og psykiske lidelser Utvidet program



Stallvik, M. & Nordahl, H. M.

*Journal of Dual Diagnosis*, 10(2), 68-78.

doi:10.1080/15504263.2014.906812

- Gjør verktøyet kliniske meningsfulle vurderinger?



# Resultater:

- N=261
- 96 (36.7%) Kun rusbehandling
- 42 (16.1%) Samtidige rus og psykiske lidelser kapabel program
- 123 (47.1%) Samtidige rus og psykiske lidelser utvidet program

## DDE signifikant :

- yngre, mindre arbeidserfaring
- høyere alvorlighetskårer ved inntak





## Kompetansesenter rus – Midt-Norge

Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin

St. Olavs Hospital

- Signifikant høyere skårer på PTSD og Psykoser
- Høy andel selvmordsforsøk (45% vs. 31%)
- Flere behandlinger i psykiatrien
- En psykisk diagnose



# Konklusjon

- Verktøyet gjør klinisk meningsfulle vurderinger
- Differensierer mellom de med lav vs. Høy intensitetsbehov
- Mange med DDE vurdering: et faresignal eller overvurderer verktøyet symptomtrykket?
- Resultatene støtter tidligere forskning ytterligere, må forskes ytterligere
- Validert for bruk i Norge



# Hvor går vi nå?

- Ny webversjon lansert april 2015-
- Continuum-The ASAM Criteria Decision Engine
- Oppgradere til webversjon
- Kursing ansatte
- Videre forskning

