

Tidlige tegn

Kartleggingsverktøy for oppfølging
av eldre personer med
utviklingshemming.

Funksjonsfall og sykdom

Vedlagt veileder

Generelle opplysninger

Kartlegging

Sjekkliste

Legemiddelark



Dekker 5 områder for endringer

Helse

Ferdigheter

Kognisjon

Atferd

Bakgrunnshendelser i
miljø og sosialt nettverk



Tidlige tegn

Første registrering (Baseline)
Alltid sammenligne med denne

Fanger opp mindre, snikende
endringer

DOKUMENTASJON!




1 Oppsummering av bistand

Fremgangsmåte for utregning av gjennomsnittlig bistandsbehov:

- Overfør summene fra de enkelte perioder til tabellen nedenfor.
- Summer bistand for alle perioder.
- Summer antall spørsmål for alle perioder, husk at spørsmål om handlinger som ikke er aktuelle (X) ikke skal taes med.
- Beregn gjennomsnittet ved å dividere (dele på) summen av bistand på summen av spørsmål som er registrert.
- Avrund til én desimal (eks. 2,495 til 2,5)
Eksempel: Sum bistand = 93, Sum spørsmål = 34. Gjennomsnitt blir $93:34 = 2,735$. Avrundet blir sum bistand 2,7
- Lag et stolpediagram i farger ved å overføre gjennomsnittlig bistand til den grafiske fremstillingen.

| | 1. registrering | | 2. registrering | | 3. registrering | | 4. registrering | | 5. registrering | |
|---|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Sum bistand | Sum spørsmål | Sum bistand | Sum spørsmål | Sum bistand | Sum spørsmål | Sum bistand | Sum spørsmål | Sum bistand | Sum spørsmål |
| Morgen | 0 | | 0,4 | | 0,2 | | 0,8 | | 20 | 10 |
| Dag | 0,6 | | 0,2 | | 0 | | | | | |
| Kveld | 0,6 | | 0,7 | | 1,1 | | 1,1 | | 27 | 8 |
| Ukentlige gjøremål | 0,3 | | 0,9 | | 1,5 | | 3,5 | | 35 | 8 |
| Sum | | | | | | | | | | |
| Gjennomsnittlig bistand (Sum bistand dividert (dele på) sum spørsmål) | 0,4 | | 0,6 | | 0,7 | | 1,8 | | 3,2 | |

Grafisk fremstilling av bistand Overfør gjennomsnittlig bistand (i tabellen over) og tegn et stolpediagram.



Adaptiv demensscreening

Omfatter alle grader av utviklingshemming. Tar utgangspunkt i personens mestring

Bør tas minst årlig på alle eldre personer med DS

Tas av minst to personer som

kjenner personen over tid.

Samme personene som tar testen

(Aldring og helse)

Pasientforløp [Down syndrom og demens](#)

